

AREÁL ŠTRKY – DENDROLOGICKÝ PRIESKUM DREVÍN

P1

druhové zloženie: *Aesculus hippocastanum* - pagaštan konský - 30 – 40 r.

Fraxinus excelsior - jaseň štíhly - 30 – 40 r.

Picea – smrek - 30 – 40 r.

Populus canescens - topol sivý - 100 r.

Populus nigra - topol čierny - 100 r.

Thuja – tuja - 30 – 40 r.

- chýba koncepcia zelene
- potreba dosadby, prebierky, ošetrovania

P2

vek: do 20

poškodenie: 10 – 20 %

sadovnícka hodnota: 4

- chýba koncepcia zelene

druhové zloženie: *Betula* – breza, *Larix* – smrekovec, *Pinus* – smrek, *Tilia* - lipa

P3

vek: 20

poškodenie: 30 %

sadovnícka hodnota: 3

- prehustený vyťahnutý porast, chýba koncepcia zelene
- prebierka, presvetlenie

druhové zloženie: *Acer platanoides* - javor mliečny, *Fraxinus excelsior* - jaseň štíhly, *Prunus sp.* - slivka, *Tilia* – lipa

P4

vek: 20 – 30

poškodenie: 30 %

sadovnícka hodnota: 3

- chýba koncepcia zelene
- ošetrovanie, prebierka, dosadby kostrových drevín

druhové zloženie: *Acer nedungo* - javor jaseňolistý, *Aesculus hippocastanum* - pagaštan konský, *Betula* – breza, *Fraxinus excelsior* - jaseň štíhly, *Populus alba* - topol biely + niekoľko pôvodných kusov

P5

vek: 30 – 40

poškodenie: 30 %

sadovnícka hodnota: 3

- prehustená výsadba
- prebierka, ošetrovanie, presvetlenie

druhovú zloženie: *Fraxinus excelsior* - jaseň štíhly

P6

vek: ± 30

poškodenie: 30 %

sadovnícka hodnota: 3

- devastovaný porast odpadom, niekoľko starých solitérov

druhovú zloženie: *Acer platanoides* - javor mliečny, *Fraxinus excelsior* - jaseň štíhly, *Populus nigra* - topol' čierny, podrast *Cornus* - drieň, *Sambucus* - baza

P7

vek: 20 – 30

poškodenie: 30 %

sadov. hodnota: 3

- degradované a neudržiavané územie

druhovú zloženie: *Fraxinus excelsior* - jaseň štíhly, *Populus alba* - topol' biely, podrast *Sambucus* (70 %) - baza

P8

vek: do 10

- odvodový pás - šírka 10 m, potenciál budúceho vegetačného pláštá

druhovú zloženie: *Acer negundo* - javor jaseňolistý, *Acer platanoides* - javor mliečny, *Populus alba* - topol' biely

P9

vek: 30

poškodenie: 60 %

sadovnícka hodnota: 2

- degradované územie padaním pôvodných starých stromov

druhovú zloženie: *Acer negundo* - javor jaseňolistý, *Fraxinus excelsior* - jaseň štíhly, *Populus alba* - topol' biely + niekoľko pôvodných kusov, podrast *Cornus mas* - drieň obyčajný, *Sambucus nigra* (75 %) - baza čierna

P10

vek: 20

poškodenie: 40 %

sadovnícka hodnota: 3

- stavebný odpad !

druhové zloženie: *Acer negundo* - javor jaseňolistý, *Fraxinus excelsior* - jaseň štíhly, *Prunus cerasifera* - slivka čerešňoplodá, *Robinia pseudoacacia* - agát biely, podrast *Sambucus* - baza

P11

druhové zloženie: *Acer negundo* - javor jaseňolistý, *Fraxinus excelsior* - jaseň štíhly, *Populus alba* - topol' biely, podrast *Cornus mas* - drieň obyčajný, *Sambucus nigra* - baza čierna

P12

vek: 10

- prehustený a zapojený porast do šírky 10 m
- prebierka, čím by vznikli kostrové dreviny

druhové zloženie: *Fraxinus excelsior* - jaseň štíhly, *Prunus sp.* - slivka, *Salix* - vrba, podrast: *Cornus* - drieň

P13

vek: 50 – 100

poškodenie: 50 %

sadovnícka hodnota: 3

- devastované územie, asociálne aktivity

druhové zloženie: *Acer negundo* - javor jaseňolistý, *Fraxinus excelsior* - jaseň štíhly, *Gleditsia triacanthos* - gledičia trojtrňová, *Populus alba* - topol' biely, podrast: *Cornus* - drieň, *Hedera* - brečtan, *Prunus* - slivka, *Sambucus* - baza

P14

vek: 10 – 15

poškodenie: 40 %

sadovnícka hodnota: 3

- prehustený lesný porast

druhové zloženie: ťažiskový - *Acer negundo* - javor jaseňolistý, ťažiskový *Fraxinus excelsior* - jaseň štíhly, mladé: *Populus alba* - topol' biely, *Prunus*

cerasifera - slivka čerešňoplodá, podrast: *Sambucus* - baza

P15

vek: 20 – 30

poškodenie: 40 %

sadovnícka hodnota: 3

- degradované územie odpadom

druhové zloženie: *Acer platanoides* - javor mliečny, *Fraxinus excelsior* - jaseň štíhly, *Gleditsia triacanthos* - gledíčia trojtrňová, *Populus nigra* - topol' čierny, *Prunus cerasifera* - slivka čerešňoplodá, *Salix* - vřba + pôvodné solitéry, podrast: *Sambucus* - baza

P16

vek: 50

poškodenie: 30 %

sadovnícka hodnota: 3

- agátová alej
- doplnenie aleje

druhové zloženie: *Populus nigra 'Italica'* - topol' čierny, *Prunus domestica* - slivka domáca, *Robinia pseudoacacia* - agát biely

P17

vek: 20 – 30

poškodenie: 40 %

sadovnícka hodnota: 3

- komplexný líniový porast okolo kanála
- doplnenie aleje a

Druhové zloženie: *Acer negundo* - javor jaseňolistý, *Acer pseudoplatanus* - javor horský, *Populus canescens* - topol' sivý, *Prunus sp.* - slivka, *Robinia pseudoacacia* - agát biely

P18

vek: 40 – 50

poškodenie: 40 %

sadovnícka hodnota: 3

- staršie jedince, dosadené druhy, neperspektívne stĺpovité tuje

druhové zloženie: *Acer platanoides* - javor mliečny, ťažiskový: *Fraxinus excelsior* - jaseň štíhly, *Gleditsia triacanthos* - gledíčia trojtrňová, *Robinia pseudoacacia* -

agát biely, nasadený: *Juglans* – orech, nasadený: *Picea* – smrek, stípvitý: *Thuja*
– tuja, *Tilia* - lipa , podrast: *Prunus sp.* - slivka

P19

vek: 20 – 30

poškodenie: 30-40 %

sadovnícka hodnota: 3

– kvalitnejší, hodnotnejší porast

druhovú zloženie: *Acer platanoides* - javor mliečny, *Populus alba* - topoľ biely,
Prunus sp. - slivka, ťažiskový: *Prunus spinosa* - trnka, ťažiskový: *Robinia pseudoacacia* - agát biely